Parapoliops grioti, nuevo Actiino útil argentino (Dipt.)

Por EVERARD E. BLANCHARD

PARAPOLIOPS gen. n.

Cerca de *Italispidea*, T. T., distinguiéndose por la parafrontalia más ancha que la frontalia; *OC* bien desarrolladas; 2 *ACA* fuertes, y otros caracteres incluídos en la descripción del genotipo que sigue:

Parapoliops grioti sp. n.

Hembra. — Cutícula cefálica amarillo ocrácea; el occipucio y placa ocelar negros, la frontalia morena. Parafrontalias y la mitad superior de las parafacialias con pruina clara dorada, la mitad inferior de las parafacialias, las facialias, lámina facial, epistomio, mejillas, occipucio y postórbitas, con excepción del extremo superior amarillento, con pruina blanca cenicienta. Altura cefálica 1,26; ancho 1,52. Eje antenal 0,90; vibrisal 0,64; oral 0,54. Frente 0,68<0,75, subhorizontal, de perfil subrecto proyectándose 0,14 del plano ocular anterior. Cara 0,75<1,00. Perfil frontofacial 0,72+1,04, con ángulo de 105°. Frontalia 0,50>0,21<0,22, calva. Parafrontalias 0,16<0,30, con escasos pelitos negros esparcidos. Parafacialias 0,30>0,18<0,23 con pocos pelitos negros esparcidos en la mitad superior. Facialias subparalelas, 0,12, calvas. Lámina facial 0,93×0,39 de ancho, fuertemente hundida, con carena débil longitudinal. Epistomio 0,07×0,36 de ancho, un poco levantado del plano de la lámina, pero sin proyectarse entre las áreas vibrisales. Mejillas 0,36 con sólo 2-3 pelitos negros. Muesca facial calva. Ojos 0,90 ×0,61 calvos. Postórbitas calvas. Occipucio bien inflado con pocas sétulas negras en el tercio superior de cada paracéfalo; demás pelos pálido amarillentos. *FR* 4 pares en líneas débilmente extracurvadas, la *FRA* en el nivel del $^1/_3$ apical del II antenal. *FROP* 2, *FROR* 1, *VRI* 0,81, convergentes, dos veces las *VRE*. *OC* fuertes, proclino-divergentes. *PO* 10 en los $^2/_3$ superiores del arco postorbital, la serie continuada con sétulas negras finas. *IPO* 4-5 en el $^1/_5$ superior de los paracéfalos. *FCL* 7 en los $^2/_3$ inferiores. *VB* fuertes, casi 3 veces las *FCL*, cruzadas, apenas por encima del nivel oral y separadas por 0,76 de la línea máxima inter *FCL*. *PVB* 1-2, más largas que las *FCL*, mayores. *PRSTM* 2 subiguales a las *PVB* *GNO* 1 cerca de las *PRSTM*. y apenas más cortas.

Orificio oral 0,50×0,41 de ancho, la mitad posterior semicircular y la anterior subparalela. Haustelo 040×0,16, pardo amarillento obscuro con un par de cerdas negras largas sub-basales y otras más cortas sublaterales. Labela 0,14, pálido amarillenta con cerdas largas del mismo color. Palpos 0,43×0,03<0,06, claro amarillentos claviformes, la mitad apical algo supracurvada con 3-4 cerdas largas apico-ventrales, 3 veces el ancho máximo del palpo y algunas muy cortas dorsales y ventrales.

Antenas negras, el I, II, extremo basal del III y la mitad basal de su cara interna, anaranjados. II 0,18×0,14. III 0,75×0,14, subparalelo con ápice subtruncado, separado del nivel vibrisal por 0,07, arista 0,90, pardo obscuro con el II y la mitad distal del III negruzca. 1 muy corto; II apenas más largo que ancho; III con los $^2/_5$ basales engrosados, la mitad apical flageliforme, micropubescente hasta muy cerca de su ápice.

Cutícula torácica negruzca con pruina blanco cenicienta, destacándose dos pares de fajas longitudinales, las submedianas estrechas, divergentes y continuas entre las líneas acrosticales y dorsocentrales hasta la $^1/_3$ anterior de la postsutura; laterodorsales anchas, con los bordes internos limitados por las líneas dorsocentrales, los externos separados de las líneas *IAL* por más de la mitad de su ancho, ininterrumpidas hasta el nivel de la IPAL. Propleuras, placas lateropostescutelares, declive postalar y barreta, calvas. Prosterno con un par de *PRST* y un pelito negro a cada lado. Mesonoto con escasos pelitos cortos negros; las pleuras casi calvas. *AC* 2+3, la *ACA* posterior lejos de la sutura. *DC* 3+3, largas. *IAL* 0+3. *IPAL* subigual a la penúltima *ACP*, *SAL* 1+3, la *SALA* fuerte y al interior de la línea, la *SALP* intermedia 2 ½ veces la posterior. *PAL* 2, la *PALI* 2 veces la *PALE*, *HM* 3, *IHM* 1. *STPL* 2 fuertes. *PTPL* 1 fuerte apenas más de la mitad de la *STPLP*.

Escutelo 0,55×0,72 de ancho, convexo, de cutícula negra con pruina blanco cenicienta uniforme y escasos pelitos negros esparcidos, *LM* 3, las *B* y *ANG* fuertes, las últimas 2 veces el largo del escutelo. *PRB*, *DSC* y *AP* subiguales a la mitad de las *ANG*, las *AP* divergentes.

Patas ocre anaranjadas, los tarsos y tibias negros. Tibias intermedias con una *A* en los $^2/_5$ distales; 1 *V* y 2 *PD*. Metatibias con 4 *AD*, 2 *PD* y 3 *AV*.

Alas 4,30×1,45, subhialinas con nervaduras parduscas. Charretera negra; basicosta anaranjada; costigio amarillo blanquecino. Prestigma 0,82; estigma 0,32; postestigma 1,40; radiocosta 0,68; distocosta 0,03; sección apical 0,03, R6 0,08; a 0,07 del perpendículo del ápice estigmático. *M1* 0,64, apenas intracurvada. *M2:* 0,75+0,80+0,68. Codillo suavemente curvado, de 128°; 2,66 veces más lejos del ápice que del borde posterior y separado de éste por 0,20 del ancho alar transcodillar. *M3* 0,43, recta. *C1:* 1,45+0,43, la última sección pigmentada en casi toda su extensión. *CS* 2 fuertes subiguales a la *R6*. Espínulas costales hasta el $^1/_3$ proximal de la radiocosta. Prefurca con 2 sétulas fuertes dorsales y ventrales. Escamas y escamillas blanco subopalinas con flequillo y reborde del mismo color. Balancines claro ocráceos.

Abdomen 2,34×1,45 de ancho, de cutícula negra, el $^1/_3$ mediano del aspecto ventral claro ocráceo. II, III y IV con pruina blanco cenicienta subteselada, los bordes apicales del II y III algo lucientes. Todos los segmentos con escasos pelitos negros reclinados. Esternitos cubiertos. Tergitos I y II con 8 *DM* diferenciadas, las *MDM* más robustas, y 7 *LM*; III con 8 *M* subiguales; IV con hilera irregular de 12 *DSC* y numerosas *PRAP* y *AP*.

Largo, 4,50 mm.

Holotypus. — 1 hembra ex. *Ecpantheria*, 10/IX/51, José C. Paz (Prov. Buenos Aires), criado por el ingeniero Mario Griot, a quien gustosamente dedico esta especie nueva.